

Coumadin (Warfarin)

Coumadin is also called Warfarin. This type of medicine is called an anticoagulant or blood thinner. Coumadin helps stop clots from forming in the blood. A blood clot could cause serious problems if it moved to a different part of the body such as the heart, lungs or brain.

The full effect of Coumadin may take 3 to 7 days. Your doctor will use a blood test to adjust your Coumadin dose. The blood test is called an INR (International Normalized Ratio). It measures how long it takes your blood to clot. Your Coumadin dose may be changed to keep the best INR range for your condition. Keep your lab and doctor appointments.

Take Coumadin As Ordered

- Coumadin comes in tablets to be taken by mouth.
- Your doctor will tell you how much medicine to take. This is your **dose**. Your dose may change based on your blood test.
- Take Coumadin **one time** each day, at the **same time** each day.
- If you forget a dose, **do not** take two doses the next day. Call your doctor if you miss two or more doses.
- Never stop taking your Coumadin unless told to do so by your doctor.
- Keep a supply of medicine so you do not run out. Plan ahead for weekends, holidays and vacations.
- Do not share this medicine with anyone.
- Tell all of your health care providers you are taking Coumadin. This includes your doctors, dentists, nurses, pharmacists and emergency workers.
- Eat your normal diet while taking Coumadin. Do not change the amount of green, leafy vegetables you eat in your diet.
- Check with your doctor before drinking alcohol such as beer, wine and liquor.

الكومادين (الوارفارين)

يُعرف الكومادين أيضاً باسم الوارفارين. ويُطلق على هذا النوع من الدواء مانع التخثر أو مرقق الدم. ويساعد الكومادين على منع تكوين الجلطات في الدم. ويمكن أن تؤدي الجلطة الدموية إلى مشكلات خطيرة إذا انتقلت إلى جزء مختلف من الجسم، مثل القلب أو الرئتين أو المخ.

وقد يستغرق المفعول الكامل لعقار الكومادين ما يتراوح من 3 إلى 7 أيام. وسوف يستخدم الطبيب المعالج اختباراً دموياً لضبط جرعة الكومادين. ويُطلق على اختبار الدم هذا 'اختبار نسبة سيولة الدم INR'. وهو يقيس المدة التي يستغرقها الدم في التجلط. ويمكن تغيير جرعة الكومادين للحفاظ على أفضل مدى لنسبة السيولة لحالتك. حافظ على مواعيدك مع الطبيب المعالج والمعمل.

تناول الكومادين حسب الإرشادات

- يأتي الكومادين على شكل أقراص للتناول عن طريق الفم.
- سوف يُخطرک الطبيب بمقدار الدواء الذي ينبغي أن تتناوله. وسيكون ذلك المقدار هو الجرعة المقررة لك. وقد تتغير الجرعة وفقاً لاختبار الدم الخاص بك.
- تناول الكومادين **مرة واحدة** يومياً، في **نفس الموعد** من كل يوم.
- إذا نسيت جرعة، **فلا تتناول جرعتين في اليوم التالي**. ولكن اتصل بالطبيب إذا فاتتك جرعتان أو أكثر.
- لا تتوقف عن تناول الكومادين ما لم يطلب منك الطبيب المعالج ذلك.
- احرص على أن يكون لديك مخزون من الدواء حتى لا ينفد منك. خطط مسبقاً لنهايات الأسبوع والأجازات والعطلات.
- لا تشارك هذا الدواء مع أي شخص.
- أخبر جميع مقدمي الرعاية الصحية بأنك تتناول الكومادين، وهذا يشمل الأطباء المعالجين وأطباء الأسنان والممرضين والأطباء الصيدلانيين وعمال الطوارئ.
- تناول غذاءك المعتاد أثناء تناول الكومادين. ولا تغير مقدار الخضروات الخضراء والمورقة التي تأكلها في غذائك.
- استشر الطبيب قبل تناول الكحوليات، مثل البيرة والخمر والمسكرات.

Call your doctor or pharmacist if you have:

- Unusual bleeding
 - Coughing up or vomiting red or brown material that looks like coffee grounds
 - Nose bleeds or extra bleeding from the gums around your teeth
 - Red or black tarry stools
 - Red or dark urine
 - Bruises that appear without injury
 - Bleeding from cuts that do not stop with pressure
 - Very heavy vaginal bleeding or menstrual flow
- Pain, swelling, or discomfort
- Severe headache
- Weakness slurred speech or visual changes
- Nausea, vomiting or diarrhea that lasts more than 24 hours
- Tiredness, fever, chills, sore throat, itching rash or mouth sores
- Any new signs after starting this medicine

Precautions

- Talk to your doctor or pharmacist before taking any new medicines. This includes prescription medicines, over the counter medicines, herbals, food supplements and home remedies. These can make Coumadin not work as it should.
- Coumadin should not be taken during pregnancy. If you think that you are pregnant or may become pregnant, tell your doctor **right away**.
- Avoid sports or other activities that may cause injury like bruising, cuts or serious injury. Report any falls or blows to the head to your doctor **right away**.

Talk to your doctor or pharmacist if you have any questions or concerns.

اتصل بالطبيب المعالج أو الصيدلاني إذا كنت تعاني من:

- نزيف غير عادي
 - سعال وتقيؤ مواد حمراء أو بنية تبدو مثل ثفل القهوة.
 - نزيف من الأنف أو نزيف زائد من اللثة حول أسنانك
 - براز قطراني أحمر أو أسود
 - بول أحمر أو قاتم
 - كدمات تظهر بدون إصابة
 - نزيف من جروح لا يتوقف مع الضغط
 - نزيف مهبلي حاد أو نزيف حيضي
- ألم أو تورم أو عدم ارتياح
- صداع حاد
- الضعف أو عدم التحدث بوضوح أو تغيرات في الرؤية
- الغثيان أو التقيؤ أو الإسهال الذي يستمر لأكثر من 24 ساعة
- التعب أو الحمى أو القشعريرة أو التهاب اللوزتين أو الطفح الناتج عن الحك أو التهابات الفم
- أي مؤشرات جديدة بعد بدء هذا العلاج

احتياطات

- تحدث إلى الطبيب المعالج أو الصيدلاني قبل تناول أية أدوية جديدة. وهذا يشمل الأدوية الموصوفة بنشرة طبية والأدوية غير الخاضعة لإشراف الطبيب والأعشاب والمكملات الغذائية والعلاجات المنزلية، حيث إن هذه الأشياء قد لا تجعل الكومادين يؤدي وظيفته كما ينبغي.
- ينبغي عدم تناول الكومادين أثناء الحمل. إذا كنت تعتقدين أنك حبلى أو قد تصبحين حبلى، فالرجاء إخبار الطبيب المعالج على الفور.
- تجنب الرياضات أو غيرها من الأنشطة التي قد تسبب الإصابات مثل الكدمات أو الجروح أو الإصابات الخطيرة. أخبر الطبيب المعالج بأي حالات سقوط أو لكمات تعرضت لها رأسك على الفور.

تحدث إلى الطبيب المعالج أو الصيدلاني إذا كانت لديك أية أسئلة أو مخاوف.